



Lidocaine 2%

2 gm / 100 gm Gel

Lidocaine hydrochloride

Local Anaesthetic

Composition:

Each 100 gm contains:

Lidocaine hydrochloride 2.0 gm equivalent to Lidocaine base 1.62 gm

Properties:

Lidocaine is a safe and effective local anaesthetic for surface use . when applied locally it prevents the generation and conduction of nerve impulse , altering the permeability of ions , particularly the sodium influx through the cell membrane

It is usually effective within 5 minutes of application and has a duration of effect of 1-2 hours .

Indications & Usage:

Lidocaine can be used topically to give relief from local pain and / or itching due to :

- Mild burns and sun burns
- Insect bites.
- Sore nipples and abrasions .
- Pruritus ani and vulvae
- Anal fissures and haemorrhoids
- Proctoscopy and sigmoidoscopy
- Stomatitis
- Herpetic lesions

Side Effects:

Local adverse reactions are very rare with Lidocaine and include allergic skin reactions .

Dosage & Administration:

Apply to the affected areas as a thin film 1-2 times daily .

Packing:

Pack contains tube of 20 gm

Finance Code :2464

- Medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sells the medicament.
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine. its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep medicament out of reach of children

Council of Arab Health Ministers and Union of Arab Pharmacists



Produced by: Alexandria Co. for Pharmaceuticals & Chemical Industries
Alexandria - Egypt



ليدوكايين ٢٪

٢ جم / ١٠٠ جم جيل
ليدوكايين هيدروكلوريد
مخدر موضعي

التركيب:

يحتوي كل ١٠٠ جم على:
ليدوكايين هيدروكلوريد ٢ جم تكافئ ليدوكايين قاعدة ١,٦٢ جم

الخواص:

ليدوكايين مخدر موضعي فعال وآمن للإستعمال الخارجي . وعند إستعمال المستحضر موضعيا فإنه يمنع تخليق وتوصيل النبضات العصبية من خلال تقليل نفاذ أيونات الصوديوم خلال جدار الخلية . يعطى المستحضر فاعلية خلال ٥ دقائق من الإستعمال ويستمر مفعولة من ساعة إلى ساعتين .

دواعى الاستعمال:

- يستخدم ليدوكايين لتسكين الآلام الموضعية و / أو الحكمة الناتجة من :
- الحروق البسيطة و حروق الشمس
 - لدغ الحشرات
 - تشنجات حزمة التدى والسحجات
 - الحكمة الشرجية والفرجية
 - الشق الشرجي والبواسير
 - عند إستخدام مناظير الشرج والقولون
 - إلتهابات الفم
 - الإصابة بالهريس

الأعراض الجانبية:

نادرا ما تحدث أعراض جانبية موضعية وتكون فى صورة حساسية جلدية .

طريقة الإستعمال و الجرعة:

يدهن المكان المصاب بطبقة رقيقة من الجيل مرة او مرتين يوميا .

العبوة:

عبوة تحتوى على أنبوبة بها ٢٠ جم .

Finance Code :2464

- الدواء مستحضر طبي يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا لتعليمات بعرضك للخطر .
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلى الذى صرفها لك .
- الطبيب والصيدلى هما الخبيران بالدواء وينفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .
- لا تكرر تناول الدواء إلا بتعليمات من الطبيب.
- لا تترك الدواء فى متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيادلة العرب

إنتاج : شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية - الإسكندرية - ج.م.ع.

