



# Antiver

## Mebendazole Suspension

### Anthelmintic

#### Composition:

Each teaspoonful (5 ml) contains:  
Mebendazole 100 mg

#### Properties:

Antiver is a broad spectrum anthelmintic. It contains mebendazole which possesses vermifugal and ovicidal activities with a high cure rate against most gastrointestinal tract (GIT) helminths and their ova.

Mebendazole selectively and irreversibly blocks glucose uptake by adult worms and larvae through inhibiting the formation of the worms microtubules. Consequently, the energy sources, glycogen and ATP are depleted in the worms, leading to their immobilization and death.

Mebendazole is poorly absorbed from GIT, thus giving effective concentrations to act locally on the worms. This property ensures high efficacy, excellent tolerability and makes Antiver the drug of choice in single and multiple helminth infections of GIT.

#### Indications & Usage:

Antiver is the anthelmintic of choice for the treatment of infections with:

Oxyures, <i>Enterobius vermicularis</i>	(Pinworm)
<i>Ascaris lumbricoides</i>	(Roundworm)
<i>Ankylostoma duodenale</i>	(Hookworm)
<i>Trichuris trichiura</i>	(Whipworm)
<i>Strongyloides stercoralis</i>	(Threadworm)
<i>Taenia</i> spp.	(Tapeworm)

Mixed helminth infections.

#### Contra - Indications:

As with other preparations containing mebendazole, the drug is contra-indicated during pregnancy.

#### Side Effects:

No side effects have been reported.

#### Dosage & Administration:

As directed by the physician or as follow:

The same dosage regimen applies to adults and children over two years.

Enterobiasis: One teaspoonful (5 ml) as a single dose, repeated after two or three weeks.

Ascariasis, Ankylostomiasis, Trichuriasis and Mixed infections:

One teaspoonful ( 5 ml ) morning and evening for three consecutive days.

Strongyloidiasis and Taeniasis:

Two teaspoonful ( 10 ml ) morning and evening for three consecutive days.

N.B: No special dietary measures, fasting or purging are required before or after the treatment with Antiver suspension.

#### Packing:

Carton box contains a bottle of 30 ml

#### Storage:

Store in airtight container away from light in a temperature not exceeding 25°C.

Finance Code : 5545/20

- Medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sells the medication.
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine. its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep medicament out of reach of children

Council of Arab Health Ministers and Union of Arab Pharmacists



Produced by: Alexandria Co. for Pharmaceuticals & Chemical Industries - Alex. -Egypt



# أنتيفير

ميبندازول

معلق

طارد للديدان

التركيب:

حتوى كل ملعقة شاي (٥ مللى) على:

ميبندازول ١٠٠ مجم

الخواص:

أنتيفير طارد للديدان واسع المجال . و يحتوى على مادة ميبندازول ذات التأثير القوى و القاتل للديدان و بيض الديدان التى تصيب القناة الهضمية ما يؤدى إلى الشفاء التام من الإصابة بها .

و يعمل ميبندازول اختياريا و غير عكسيا على منع امتصاص الجلوكونوز فى الديدان البالغة و اليرقات و ذلك عن طريق منع تكوين الـ Microtubules و بالتالى يؤدى إلى استنفاد مصادر الطاقة و الجليكوجين و ATP فى الديدان مما يؤدى إلى شل حركتها و موتها يتميز ميبندازول بامتصاص ضعيف من القناة الهضمية معطيا تركيزات فعالة للتأثير موضعيا على الديدان و هذه الخواص مجتمعة جعل أنتيفير الدواء الأمثل لعلاج إصابة القناة الهضمية بنوع أو أكثر من الديدان.

دواعى الاستعمال:

يستعمل أنتيفير فى علاج الإصابة بالديدان الآتية:

- اوكسيرييس. انتيروبيوس فيرمكولارس ( الدودة الدبوسية )
- اسكارس لومبريكويدز ( الدودة الأسطوانية )
- انكليستوما ديودينالى ( الدودة الخيطية )
- ترايكويراس ترايكورا ( الدودة السوطية )
- سترنوجيلويديس استركورالز ( الدودة الخيطية )
- أنواع التينيا ( الدودة الشريطية )

- الإصابة المتعددة بالديدان.

نواهى الاستعمال:

كما هو الحال فى الأدوية الأخرى المحتوية على ميبندازول لا يستخدم الدواء أثناء فترة الحمل.

الأعراض الجانبية:

لا توجد أعراض جانبية لأنتيفير.

طريقة الاستعمال والجرعة:

طبقا لإرشادات الطبيب أو كما يلي :

تستخدم نفس الجرعة للكبار و الصغار فوق سن سنتين.

- انتيروبيوس: ملعقة واحدة ( ٥ مللى ) كجرعة واحدة . ثم تكرر نفس الجرعة بعد أسبوعين أو ثلاثة.

- الاسكارس و الانكليستوما و الدودة السوطية و الإصابة المتعددة بالديدان: ملعقة واحدة ( ٥ مللى ) صباحا و مساء يوميا لمدة ثلاثة أيام متتالية.

- الدودة الخيطية و التينيا: ملعقتان ( ١٠ مللى ) صباحا و مساء يوميا لمدة ثلاثة أيام متتالية.

ملحوظة: لا يحتاج قبل أو بعد العلاج بانتيفير إلى نظام غذائى خاص أو الصوم عن الطعام أو تناول المسهلات.

العبرة:

علبة كرتون حتمى على زجاجة بها ٣٠ مللى.

التخزين:

يحفظ فى عبوة محكمة الغلق بعيدا عن الضوء عند درجة حرارة لا تزيد عن ٢٥ °م

Finance Code : 5545/20

- الدواء مستحضر طبي يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا لتعليمات يعرضك للخطر .

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلى الذى صرفها لك .

- الطبيب والصيدلى هما الخياران بالدواء وينفعه وضرره.

- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .

- لا تكرر تناول الدواء إلا بتعليمات من الطبيب.

- لا تترك الدواء فى متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيادلة العرب

إنتاج: شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية - الإسكندرية - ج.م.ع

